



ไบรท์-กรีน

ไบรท์-กรีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ใช้ในช่วงที่พืชกำลังสร้างผลผลิต ได้แก่

- ไม้ผล เช่น ลำไย เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง ทุเรียน ลิ้นเขียวหวาน ลิ้นโอ ฯลฯ ในระยะติดผลแล้ว ฉีดต่อเนื่องไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
- พืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันเทศ หอม กระเทียม หอมใหญ่ ฉีดพ่นเมื่อพืชลงหัวแล้วฉีดต่อเนื่องไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
- ไม้ดอก เช่น กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง ฉีดเพื่อความเข้มของดอกและปรับปรุงคุณภาพดอก ฉีดพ่นเมื่อพืชเริ่มออกดอก
- ธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ฉีดพ่น ฉีดพ่นเมื่อติดเมล็ดแล้ว เพื่อการสะสมแป้งในเมล็ด
- พืชผักกินใบ ฉีดพ่นเพื่อเพิ่มความหนาและความสดใสของสีเขียว ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 2-3 ครั้ง

ถ้าพืชขาดไบรท์-กรีน ในช่วงดังกล่าวใบจะเหลืองและไหม้เร็ว ยิ่งติดผลมากใบยิ่งไหม้เร็วมาก ส่งผลให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ น้ำหนักผลผลิตลดลง

คุณสมบัติของไบรท์-กรีน

ไบรท์-กรีน คือ แมงกานีสคีเลท แมงกานีสเป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการใช้เพื่อคงสภาพของคลอโรฟิลล์และเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของคลอโรฟิลล์ การฉีดพ่นไบรท์-กรีน นอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตแล้ว ในไม้ผลหรือพืชอายุหลายปี จะช่วยทำให้มีอาหารสะสมในต้นเพียงพอต่อการแตกใบใหม่ได้ใบใหม่ที่มีคุณภาพในการฟื้นฟูสภาพต้น เพื่อการออกดอกในปีต่อไป

อัตราการใช้ ใช้ไบรท์-กรีน ควบคู่กับผลิตภัณฑ์เกษตรในระยะสร้างและปรับปรุงผลผลิต เช่น ไกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 และโบโร-แคล โดยฉีดพ่นในอัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน หรือผักกินใบ โดยฉีดพ่นร่วมกับไกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 หรือ ไกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10 หรือไกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 และโบโร-แคล ในอัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

ใช้ไบรท์-กรีน ลดการสะสมแมลงพิษในพืช

โมเด็ม



โมเด็ม คือ โมลิบดินัม 4% เป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการน้อย เพื่อนำไปใช้ในขบวนการทางเคมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนและใช้ธาตุไนโตรเจนในพืช ดังนั้น โมเด็มจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อต้องการให้เจริญเติบโตในช่วงสร้างยอดและใบ รวมทั้งพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้

- พืชจำพวกล้มลุก เถาเลื้อยทุกชนิด ได้แก่ แตงกวา บวบ แตงท่อน มะระ พักทอง ผักเขียว ฯลฯ ใช้โมเด็มอัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นผสมปุ๋ยไกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10 หรือไกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 และโบโร-แคล ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน ในช่วงสร้างต้น ใบ ส่วนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้สลับกับสูตรบำรุงผลและเร่งดอก เมื่อใช้ไกรแม็กซ์ 6-20-30 + โบโร-แคล โดยไม่ต้องผสมโมเด็ม
- พืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน ฯลฯ ใช้โมเด็มอัตรา 5 ซีซี ผสมปุ๋ยไกรแม็กซ์ 30-10-10 หรือ 20-20-20 หรือ 15-15-15 อัตรา 100 กรัม และโบโร-แคล ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต หลังจากออกดอกแล้ว ควรหยุดใช้โมเด็ม เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ใช้โมเด็มเป็นครั้งคราว โดยผสมกับไกรแม็กซ์ 20-20-20 เพื่อฟื้นฟูสภาพต้น
- พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วต่างๆ เช่น ถั่วพู ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วลิสง ฯลฯ ใช้โมเด็มอัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมปุ๋ยไกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 หรือ 30-10-10 หรือ 15-15-15 อัตรา 100 กรัม ฉีดพ่นระยะแรกสำหรับถั่วที่เก็บเกี่ยวครั้งเดียว เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ส่วนถั่วฝักสวนครัว เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วพู ที่เก็บเกี่ยวเรื่อยๆ ใช้โมเด็มผสมปุ๋ยไกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 ฉีดพ่นหลังจากออกดอกแล้ว และฉีดพ่นสลับกับปุ๋ยไกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 ในช่วงเก็บเกี่ยว
- พืชผักกินใบ ยอด เช่น ตำลึง ผักหวาน ผักบุ้ง ผักกะเฉด กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม ใช้โมเด็ม อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมปุ๋ยไกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 หรือ 30-10-10 อัตรา 100 กรัม และโบโร-แคลฉีดพ่นสำหรับผักฉีดพ่นตลอดจนกระทั่งเก็บเกี่ยว

เมื่อใช้โมเด็ม ต้องใช้คู่กับปุ๋ยไกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10 ไกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 ไกรแม็กซ์ 15-15-15 เท่านั้น