



## มะนาวนอกฤดู กับผลิตภัณฑ์กีเฟฟารีน

มะนาวนอกฤดูเป็นที่สนใจเพราะมีราคาแพงกว่าปกติ (มะนาวที่ออกมาสู่ตลาดมาก) มีการสรรหาสารเคมีหรือฮอร์โมนหรือมีการอวดอ้างสรรพคุณกันมากกว่าจะทำให้ออกได้ แต่หลักการทั่วไป เราสามารถทำให้มะนาวออกนอกฤดูได้ง่ายพร้อมๆ กับใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกีเฟฟารีน ดังต่อไปนี้

การทำมะนาวนอกฤดู นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

- ถ้าเป็นมะนาวปลูกใหม่หรือมะนาวลาอายุไม่เกิน 5 ปี สามารถทำให้ออกนอกฤดูได้ เพราะมะนาวนั้นออกดอกง่ายอยู่แล้ว โดยอาศัยหลักการงดการให้น้ำก่อนออกดอก ดังนั้นจะเห็นว่า วิธีต่างๆ ที่นำเสนอโดยทั่วไป เช่น ปลูกในถังซีเมนต์หรือในถุงดำได้ง่าย และเมื่อมีฝนก็เอาผ้าพลาสติกคลุมเพื่อให้น้ำแห้ง

ในกรณีปลูกในถังหรือถุงดำ ให้งดให้น้ำแล้วฉีดพ่นผลิตภัณฑ์เกษตรกีเฟฟารีน ดังต่อไปนี้

ฉีดเพื่อสะสมอาหาร ใช้ 10-52-17 4 ซ้อนแกงพูน ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 หรือ ทีโอ-เค (0-0-25) 30 ซีซี (2 ซ้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 เทอร์โบไฮโอแม็ก 1 ซ้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 โบโร-แคล 2 ซ้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 เกรทกรีน พลัส 1 ซ้อนตวงโบโร-แคล ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน ก่อนตั้งช่อดอก หรือช่อดอกอาจจะแตกออกมาเองเลยก็ได้ (ปุ๋ยทางดินใส่ 8-24-24 หรือ 9-24-24 ตามขนาดของต้น) ในระยะใบอ่อนชุดสุดท้าย ใส่ตามขนาดของต้น ก่อนพ่นปุ๋ยชุดสะสม

หลังจากนั้นให้เริ่มให้น้ำแต่น้อย โดยทยอยให้อย่าให้มากเกินไปโดยเร็ว เพราะอาจทำให้ใบใหญ่และสลัดดอกบางส่วนได้ หลังจากนั้นฉีดปุ๋ย ดังนี้

ใช้ โกรแม็กซ์ 10-52-17 4 ซ้อนแกงพูน ต่อน้ำ 20 ลิตร

โบโร-แคล 2 ซ้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 เม็กก้า-ซิงค์ 1 ซ้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 เกรทกรีน พลัส 1 ซ้อนตวงโบโร-แคล ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 โดยฉีดพ่นทุก 7-10 วัน เมื่อมะนาวติดลูกดีแล้ว ให้ใช้ต่อไปโดยเปลี่ยนสูตรปุ๋ยโกรแม็กซ์ จาก 10-52-17 เป็นโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 โดยฉีดโบเหมือนเดิม

ใช้ โกรแม็กซ์ 15-15-15 4 ซ้อนแกงพูน ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 ทีโอ-เอ็น 30-0-0 2 ซ้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 โบโร-แคล 1-2 ซ้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 เม็กก้า-ซิงค์ 1 ซ้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 เกรทกรีน พลัส 1 ซ้อนตวงโบโร-แคล ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นจนถึงเดือนที่ 3 หลังจากนั้นให้เปลี่ยนสูตรเพื่อปรับให้เปลือกบาง ดังต่อไปนี้

ใช้ โกรแม็กซ์ 20-20-20 4 ซ้อนแกงพูน ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 โบโร-แคล 1-2 ซ้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร  
 เกรทกรีน พลัส 1 ซ้อนตวง ต่อน้ำ 20 ลิตร

สมาชิกสามารถเพิ่มโบรทกรีน 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ได้บางช่วงเพื่อเสริมสร้างสีเขียวทนและเพื่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงที่ใบ

ในกรณีที่ปลูกเป็นมะนาวกรร่ง สามารถทำได้ง่ายกว่ามะนาวไร่ เพราะเมื่อให้น้ำหรือฝนตก ดินสามารถระบายน้ำได้ดีกว่า ส่วนมะนาวไร่ที่ตอนจะออกดอกติดผลนอกฤดูได้ง่ายกว่ามะนาวในที่ลุ่ม ส่วนการให้ปุ๋ยให้น้ำนั้น ทางดินและทางใบใช้หลักการเดียวกัน

ขอให้สมาชิกระลึกถึงเสมอว่า หลักการให้ผลไม้หรือมะนาวออกนอกฤดูมีหลักสำคัญ คือควบคุมน้ำให้ได้และใช้ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17 ในการบังคับให้ออกดอกและอย่าลืมพิจารณาอายุของต้นมะนาวด้วย