



คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ กับพืชผักเถาเลื้อย



พืชผักเถาเลื้อยได้แก่ มะระ บวบ แตงกวา ถั่วพูยอก พริก แฟง ถั่วพู ฯลฯ

ลักษณะสำคัญของพืชเหล่านี้ คือ ทอดยอดออกไปเรื่อยๆ และออกดอกตามข้อ ถ้ามีการบำรุงไม่ทำให้โทรมและทอดยอดออกไปเรื่อยๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เรื่อยๆ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำคือ

ปุ๋ยทางดิน สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์จริงๆ เช่น มูลไก่เก่าๆ หรือปุ๋ยหมักที่หมักเองใส่คลุกเคล้าก่อนเตรียมดิน หรือรองพื้น หรือหว่านทั่วๆ ร่อง 500 กก. ต่อพื้นที่ร่อง 1 ไร่

แช่เมล็ด ด้วยเจอร์มิเนท อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร 1-2 ชั่วโมง ตามความหนา-บางของเมล็ด

ปุ๋ยเคมี ชนิดเม็ดหว่านทางดิน แนะนำให้ใช้สูตร 16-16-16 หรือ 21-7-14 ในระยะแรก โดยแบ่งใส่ ดังนี้

1. หลังจากปลูกลงแล้วหรือย้ายกล้าได้ 3-5 วัน ใช้ 1 ช้อนชา ต่อหลุมไล่ข้างๆ
2. โรยข้างๆ ประมาณ 1 ช้อนแกงต่อหลุม หลังจากใส่ครั้งแรก 1 สัปดาห์
3. โรยหรือหว่านอัตรา 20 กก. ต่อไร่ เมื่ออายุประมาณ 3 สัปดาห์ โดยใช้สูตร 16-16-16
4. หว่านปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 14-9-20 อัตรา 20 กก. ต่อไร่ ทุก 2 สัปดาห์

เมื่อใส่ปุ๋ยทางดินทุกครั้ง ควรผสมด้วยเทอร์โบแม็ก เพื่อเพิ่มธาตุแม็กนิเซียม ที่ช่วยให้ใบสีเขียวเข้ม อัตราส่วนปุ๋ยเม็ด 10 กก. ต่อเทอร์โบแม็ก 1 กก. ทุกครั้ง วิธีการผสม ใช้ภาชนะบรรจุปุ๋ยประมาณ 10 กก. ก่อนแล้วเคล้าด้วยเทอร์โบแม็ก 1 กก. แล้วหว่านเลย (ถ้าทิ้งไว้นานปุ๋ยจะขึ้นมาก)



คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับพืชผักเถาเลื้อย

<u>1 สัปดาห์หลังออก-30 วัน</u>	โกรแม็กซ์ 20-20-20 ทีโอป-เอ็น 30-0-0 โบโร-แคล โมเด็ม เกรทกรีน พลัส	50 กรัม (2 ซ้อนแกงพูน) 50 ซีซี (2 ซ้อนแกง) 5 กรัม (2 ซ้อนตวงปาด) 5 ซีซี (ครึ่งช้อนตวง) 5 ซีซี (ครึ่งช้อนตวง)	กระตุ้นราก สร้างยอด-เถา สร้างความสมบูรณ์ให้ต้นและ ช่วยให้เจริญเติบโตต่อเนื่อง เสริมสร้างราก-ความแข็งแรง กระตุ้นยอด เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน สามารถผสมยาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าเชื้อรา ถ้าจำเป็นต้องใช้ช้อนตวง คือ ช้อนในกระป๋องโบโร-แคล
<u>ระยะการสร้างดอก</u>	โกรแม็กซ์ 10-52-17 ทีโอป-เอ็น 30-0-0 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส	50 กรัม (2 ซ้อนแกงพูน) 50 ซีซี (2 ซ้อนแกง) 10 กรัม (2 ซ้อนตวงปาด) 5 ซีซี (1 ช้อนตวง)	หยุดยอดสร้างดอก	ฉีดพ่น 1 ครั้ง หรือถ้าใช้โกรแม็กซ์ 20-20-20 เป็นประจำ ดอกอาจมีมาก ถ้าเป็นที่พอใจก็ไม่ต้องใช้โกรแม็กซ์ 10-52-17
<u>ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต</u>	โกรแม็กซ์ 20-20-20 หรือ 15-15-15 สลับ 6-20-30 ทีโอป-เอ็น 30-0-0 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส	50 กรัม (2 ซ้อนแกงพูน) 50 ซีซี (2 ซ้อนแกง) 5 กรัม (1 ช้อนตวงปาด) 5 ซีซี (1 ช้อนตวง)	ขยายผล ช่วยไม่ให้เถาโหม	สูตร 15-15-15 ขยายผลได้ดีกว่า สูตร 20-20-20 สร้างดอกได้ดีกว่า ให้พิจารณาเองว่าจะใช้สูตรไหน และ 6-20-30 เติบโต

หมายเหตุ - ในที่ดินไม้ค้ำ อาจมีวัชพืชรบกวน (ในอุ้งที่โคนต้น+กลางต้น) เติบอง ให้ใช้ฮอร์โมนไทรโคแม็กซ์ 20 ซีซี (1 ช้อนแกง) ผสมฉีดไปด้วย ถ้ายอดเหลือง ให้เติมลิควิด ไธออน 3 ซีซี (1 ช้อนกาแฟ) ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง
- ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรเพิ่มแม็กกำ-ซิงค์ 5 กรัม (1 ช้อนตวง) เมื่อยอดหยุด หรือไม้ค้ำยั้ง หรือผลไม่ขยาย

