

# คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ กับไม้พุ่ม ส้มลูก



ไม้พุ่ม ส้มลูก ได้แก่ มะเขือเทศ มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือยาว พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว ฯลฯ  
ลักษณะสำคัญของพืชเหล่านี้ คือ ออกดอกติดผลไปเรื่อยๆ ตามขนาดของพุ่ม มีการแตกยอด แหนงยอด และเกิดดอกตามข้อ

## ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ใช้

- แปลงเพาะกล้า
  - แซ่เมล็ดด้วยเจอร์มิเนท อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 2 ชั่วโมง ใส่ถาดหรือกระบะเพาะ
  - ย้ายต้นลงแปลงกล้า
  - ฉีดพ่นด้วยไทรเมทิกซ์ 20-20-20 อัตรา 50 กรัม (2 ข้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมทีโอพี-เอ็น 50 ซีซี (2 ข้อนแกง) โบโร-แคล 5 กรัม (1 ข้อนดวง) + เกรทกรีนพลัส 5 ซีซี (1 ข้อนดวง) ฉีดพ่นทุก 5 วัน

- ปุ๋ยทางดิน** แนะนำสูตร 16-16-16 หรือ 21-7-14 ช่วงเดือนแรก หลังย้ายกล้า ดังนี้
- ครั้งที่ 1** หยอด 1 ข้อนชาต่อหลุมข้างๆ ต้นกล้า หลังจากย้ายกล้าได้ 5-7 วัน
- ครั้งที่ 2** ใช้อัตรา 1 ข้อนแกงต่อหลุม หลังจากใส่ครั้งแรก 1 สัปดาห์
- ครั้งที่ 3** โรยหรือหว่าน อัตรา 20 กก. ต่อไร่ เมื่อย้ายกล้าแล้ว ประมาณ 3 สัปดาห์
- ครั้งต่อไป** ใช้สูตร 16-16-16 หรือ 14-9-20 (หน้าแล้ง) 12-12-17 (หน้าฝน) อัตรา 20 กก. ต่อไร่ หว่านทุก 2 - 3 สัปดาห์ ตามสภาพของดิน

## คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกรกับไม้พุ่ม ส้มลูก

1 สัปดาห์หลังออก-30 วัน	โกรแม็กซ์ 20-20-20 ท็อป-เอ็น 30-0-0  โบโร-แคล โมเด็ม เกรทกรีน พลัส	50 กรัม (2 ช้อนแกงพูน ) 50 ซีซี (2 ช้อนแกง)  5 กรัม (2 ช้อนตวงปาด) 5 ซีซี (ครึ่งช้อนตวง) 5 ซีซี (1 ช้อนตวง)	กระตุ้นราก สร้างยอด-เถา สร้างความสมบูรณ์ให้ต้นและ ช่วยให้เจริญเติบโตต่อเนื่อง เสริมสร้างราก-ความแข็งแรง กระตุ้นยอด เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน สามารถผสมยาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าเชื้อรา ถ้าจำเป็นต้องใช้ ช้อนตวงคือ ช้อนในกระป๋องโบโร-แคล
ระยะการสร้างดอก	โกรแม็กซ์ 10-52-17 ท็อป-เอ็น 30-0-0 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส เม็กก้า-ซิงค์	50 กรัม (2 ช้อนแกงพูน ) 50 ซีซี (2 ช้อนแกง) 10 กรัม (2 ช้อนตวงปาด) 5 ซีซี (ครึ่งช้อนตวง) 5 กรัม	หยุดยอดสร้างดอก	ฉีดพ่น 1 ครั้ง หรือถ้าใช้โกรแม็กซ์ 20-20-20 เป็นประจำ ดอกอาจมีมาก ถ้าเป็นที่พอใจก็ไม่ต้องใช้โกรแม็กซ์ 10-52-17
ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต	โกรแม็กซ์ 20-20-20 หรือ 15-15-15 สลับ 6-20-30 ท็อป-เอ็น 30-0-0 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส เม็กก้า-ซิงค์	100 กรัม (4 ช้อนแกง )  50 ซีซี (2 ช้อนแกง) 10 กรัม (2 ช้อนตวงปาด) 5 ซีซี (ครึ่งช้อนตวง) 5 กรัม	ขยายผล ช่วยไม่ให้เถาโหม	สูตร 15-15-15 ขยายผลได้ดีกว่า สูตร 20-20-20 สร้างดอกได้ดีกว่า ให้พิจารณาเองว่าจะใช้สูตรไหน 6-20-30 เ่งดอก

หมายเหตุ - ในที่นี้ไม้ค้ำ อาจมีปัญหาใบแก่ (ใบอยู่ใต้ดินต้น+กลางต้น) เหลือง ให้ใช้ฮอร์โมนไทโอะนิค 20 ซีซี (1 ช้อนแกง) ผสมฉีดไปด้วย ฉ่ายอดเหลือง ให้เติมลิวคิต ไอออน 3 ซีซี (1 ช้อนแกง) ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง  
- ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรเพิ่ม เม็กก้า-ซิงค์ 5 กรัม (1 ช้อนตวง) เมื่อยอดหยุด หรือไม้ค่อยพุ่ง หรือผลไม่ขยาย  
- ใช้ตามอัตราที่แนะนำอย่างเคร่งครัด จะป้องกันมะเขือเทศไม่ให้เป็นโรคกันน้ำ

