

กระเทียม เทคนิคการใช้ปุ๋ยกลีต ธาตุอาหารเสริมและการดูแลรักษา

เตรียมหัว (กลีต) ก่อนปลูก ปุ๋ยรองพื้น (หัวก่อนปลูก) ครั้งที่ 1	แชนเจอร์มิเนท 12-12-17 หรือ 13-13-21 ปุ๋ย 25-7-7 ผสมเทอร์โบแมก	5 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร 2-3 นาที 25 กก./ไร่ 3 กระสอบ (150 กก.) 1 กระสอบ (25 กก.)	ถ้าแชน 1-2 ชม. ให้ลดอัตราลงเหลือ 2 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร ครั้งที่ 1 หลังจากปลูก 7-10 วัน หัวในอัตรา 25 กก./ไร่
ปุ๋ยทางใบ	เกรทกรีน โบโร-แคล ปุ๋ย 30-10-10 หรือ 20-20-20 เม็กกำ-ซิงค์	3 ซีซี (1 ผากระพริบแดง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 50-70 กรัม (4-6 ช้อนแกง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง)	เพื่อกระตุ้นการออกรากและทำให้ต้นแข็งแรง ครั้งแรกใช้ 50 กรัม ครั้งต่อไป ใช้ 70 กรัม เพื่อเร่งใบและยอด เพื่อช่วยยึดลำต้น
หลังจากปลูก 30 วัน	ปุ๋ยเม็ด 16-16-16 (ทางดิน)	25 กก./ไร่	
ปุ๋ยทางใบ	เกรทกรีน โบโร-แคล ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 20-20-20 เม็กกำ-ซิงค์	3 ซีซี 5 กรัม 50-100 กรัม 5 กรัม	ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน เตรียมต้นก่อนการลงหัว
หลังปลูก 60 วัน	ปุ๋ยดิน 13-13-21 หรือ 12-12-17 ผสมเทอร์โบแมก	3 กระสอบ (50 กก.) 1 กระสอบ (25 กก.)	หัวในอัตรา 25 กก./ไร่
ปุ๋ยทางใบ	เกรทกรีน โบโร-แคล ปุ๋ย 10-52-17	3 ซีซี 5 กรัม 50-100 กรัม	เพื่อหยุดต้นลงหัว ฉีดพ่นทุกๆ วัน
อายุ 75 วัน	เกรทกรีน โบโร-แคล ปุ๋ย 6-20-30 โบรท์กรีน	3 ซีซี 5 กรัม 50-100 กรัม 5 ซีซี	ฉีดจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ฉีดพ่นทุกๆ วัน จนเก็บเกี่ยว
อายุ 90 วัน	ปุ๋ยดิน 13-13-21 หรือ 12-12-17	3 กระสอบ (150 กก.)	หัวในอัตรา 25 กก./ไร่ อีก 1 ครั้ง



หมายเหตุ เมื่อปุ๋ยทางใบ สามารถผสมยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าเชื้อราได้ ในทางเดียวกัน เมื่อมีปัญหारेื่องโรคแมลง