

การใช้ผลิตภัณฑ์กับกล้วยไม้

<u>บำรุงต้น</u>	โกรแม็กซ์ 20-20-20 โบโร-แคล แม็กกำ-ซิงค์ แม็กนิเซียม ลิควิด โอฮอน เกรทกรีน พลัส	30-50 กรัม (2 ช้อนแกง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 20 กรัม (1 ช้อนแกง) 1 กรัม (1/2 ช้อนชา) 5 ซีซี (1 ฝากระหิงแดง)	กระตุ้นการแตกหน่อ สร้างความแข็งแรงของราก, ใบ ขยายขนาดของลำ เพิ่มความเขียวของใบ เร่งการสร้างความเขียว เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน
<u>ระยะก่อนออกดอก</u> <u>ระยะพ่นเชื้อจุลินทรีย์โตสุดลำ</u>	โกรแม็กซ์ 10-52-17 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส	30-50 กรัม (2 ช้อนแกง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 5 ซีซี (1 ฝากระหิงแดง)	สะสมอาหารที่ลำ สะสมอาหารที่ลำ และเพิ่มความแข็งแรง ของลำ เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	
<u>ระยะออกดอก</u>	โกรแม็กซ์ 20-20-20 โบโร-แคล แม็กกำ-ซิงค์ เกรทกรีน พลัส	30-50 กรัม (2 ช้อนแกง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 5 ซีซี (1 ฝากระหิงแดง)	บำรุงดอก บำรุงต้น สร้างความแข็งแรงของราก, ใบ, ดอก ยืดช่อดอก ขยายขนาดดอก เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน
	สลับกับ โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส โบรทกรีน	30-50 กรัม (2 ช้อนแกง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 5 ซีซี (1 ฝากระหิงแดง) 5 ซีซี (1 ช้อนชา)	เพิ่มความเข้มของสีดอก สร้างความแข็งแรงของราก, ใบ, ดอก เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการสร้างอาหารเลี้ยงต้น	

การสลับปุ๋ยโกรแม็กซ์ 20-20-20 และ 6-20-30 โดยใช้ โกรแม็กซ์ 20-20-20 ในการบำรุงช่อดอก และใช้โกรแม็กซ์ 6-20-30 เมื่อดอกส่วนมากกำลังบานและใกล้เก็บเกี่ยว
ไม่ควรใช้โบโร-แคลมากกว่าคำแนะนำ

