

การดูแลพืชหน้าหนาว เทคนิคการใช้ปุ๋ยเกล็ด ธาตุอาหารเสริมและการดูแลรักษา
สำหรับพืกรับยอด และเร่งการออกดอก

<u>ระยะแรก</u>	เกรทกรีน พลัส โบโร-แคล ปุ๋ย 20-20-20, 30-10-10, 15-15-15 หรือ 6-20-30, 10-52-17 ทีโอพี-เอ็น เจอร์มีเนท	5 ซีซี 5-10 กรัม 50 กรัม 50 กรัม 50 ซีซี 25 ซีซี	ฉีดพ่น 1 ครั้งถ้าพืชยังไม่หายงัน ฉีดพ่นซ้ำ หลังจากนี้ มาใช้สูตรตามปกติ ผักเก็บยอด ใช้กระตุ้นการออกดอก, เร่งการออกดอก
<u>โบโร-แคล</u> <u>ทีโอพี-เอ็น</u> <u>เจอร์มีเนท</u>	จะช่วยทำให้พืช ระบบรากเล็ก และผนังเซลล์แข็งแรง ถ้าอาการเย็น เพิ่มจาก 5 กรัม เป็น 10 กรัม ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ติดต่อกัน ช่วยเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนช่วงแห้งแล้ง ทำให้พืชกระชุ่มกระชวยได้ เพื่อแก้อาการชะงักงัน แก้อุดใบเป็นสีเหลือง และไม่แตกยอด กระตุ้นการออกยอดและรากของเมล็ด และการพัฒนาช่อดอกหรือผลของไม้ผล		

การใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับกุหลาบ

<u>ระยะแตกยอดและดอก</u>	โกรแม็กซ์ 20-20-20 โบโร-แคล เม็กก้า-ซิงค์ เทอริโบไทโอแม็ก เกรทกรีน	30-50 กรัม (2-4 ช้อนแกง) 10 กรัม (1 ช้อนตวง) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 20 ซีซี 3 ซีซี (1 ฝากระทิงแดง)	- เพื่อให้เกิดการแตกยอดและดอก เนื่องจากกุหลาบเป็นโรคง่าย	} ฉีดพ่น ทุก ๆ 7-10 วัน	
<u>ระยะบำรุงดอก</u>	โกรแม็กซ์ 20-20-20 กลีบ โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโร-แคล เม็กก้า-ซิงค์ เทอริโบไทโอแม็ก เกรทกรีน	30-50 กรัม (2-4 ช้อนแกง) 30-50 กรัม (4 ช้อนแกง) 5-10 กรัม (1 ช้อนตวงปกติเทียบ) 5 กรัม (1 ช้อนตวง) 20 ซีซี 3 ซีซี (1 ฝากระทิงแดง)	- ช่วยเพิ่มความยาวช่อดอก ขนาดของดอก และสีของดอก - ใช้โกรแม็กซ์ 20-20-20 ปริมาณ 30-50 กรัม น้ำ 20 ลิตร เนื่องจากกุหลาบพ่นปุ๋ยเปียกโบมาก		} ฉีดพ่น ทุก ๆ 7 วัน

ปัญหาโรค

โรคราน้ำค้าง ใช้เมธาเล็กซิล อัตรา 2 ช้อนแกง / น้ำ 20 ลิตร หรือผสมคาร์เบนดาซิม อย่างละ 1 ช้อนแกง ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
โรคตาต่างๆ ใช้แมนโคเซบ อัตรา 2 ช้อนแกง / น้ำ 20 ลิตร ฉีดป้องกันโรคเกิดโรคเชื้อรา ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน