

### คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับเผือก

<u>ย้ายปลูก - 30 วัน</u>	โกรแม็กซ์ 15-15-15 ทีโอป-เอ็น โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส	500 กรัม (ครึ่งกิโล) 500 ซีซี 10 กรัม (1 ช้อน) 5 ซีซี (2 ฝา เกรทกรีนพลัส)	เร่งต้น, ขยายใบ ทำให้เผือกใบตั้ง หนา เร่งราก, ทำให้ต้นแข็งแรง เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} ฉีดพ่นทุก 7 วัน ควรผสมโบรท์กรีน 50 ซีซี ครั้งเว้นครั้ง
ปุ๋ยทางดิน ใส่สูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร่ หรือใช้เต็มที่ไม่เกิน 50 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ทุก 15 วัน (เทอโรโบแม็กซ์ใส่ครั้งเดียว)				
<u>30-60 วัน</u>	โกรแม็กซ์ 15-15-15 ทีโอป-เอ็น โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส	500 กรัม (ครึ่งกิโล) 500 ซีซี 100 กรัม (1 ช้อน) 50 ซีซี (2 ฝา เกรทกรีนพลัส)	ขยายต้น, กอ ทำให้เผือกใบตั้ง หนา ช่วยขยายราก, ต้นแข็งแรง เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} ฉีดทุก 7 วัน ควรผสมโบรท์กรีน 50 ซีซี ครั้งเว้นครั้ง
ปุ๋ยทางดิน ใส่ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ทุก 15 วัน				
<u>ระยะลงหัว (75-90 วัน)</u>	โกรแม็กซ์ 10-52-17 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส	500 กรัม (ครึ่งกิโล) 100 กรัม (1 ช้อน) 50 ซีซี (2 ฝา เกรทกรีนพลัส)	หยุดต้น ลงหัว ขยายหัว เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} ฉีดพ่นทุก 7 วัน ผสมโบรท์กรีน 50 ซีซี ครั้งเว้นครั้ง
ปุ๋ยทางดินใส่ สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ทุก 15 วัน ผสมเทอโรโบแม็กซ์ 5 กก./ไร่				
<u>ระยะขยายหัว - เก็บเกี่ยว (100 - 180 วัน)</u>	โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโร-แคล โบรท์กรีน เกรทกรีน พลัส	500 กรัม (ครึ่งกิโล) 100 กรัม (1 ช้อน) 50 ซีซี 5 ซีซี (2 ฝา เกรทกรีนพลัส)	ขยายหัว ขยายหัว ทำให้ใบไม่ไหม้ เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} ฉีดพ่นทุก 7 วัน เพื่อให้ใบไม่ไหม้
ปุ๋ยทางดิน ใส่ 13-13-21 หรือ 12-12-17 อัตรา 25 กก./ไร่ ทุก 15 วัน				

