

การใช้ผลิตภัณฑ์กับฝรั่ง

<u>ระยะโน้มกิ่ง บังคับให้ออกดอก</u>	โกรแม็กซ์ 10-52-17 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส	1 กิโลกรัม 100 กรัม 50 ซีซี	เพื่อสะสมอาหาร และหยุดการแตกใบอ่อน ช่วยในการสะสมอาหาร สารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยในการดูดซึม	} ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
<u>ระยะแทงยอด และระยะผลเล็ก</u>	โกรแม็กซ์ 15-15-15 โบโร-แคล แม็กกำ-ซิงค์ เกรทกรีน พลัส ท็อปเอ็น 30-0-0	½ กิโลกรัม 100 กรัม 100 กรัม 50 ซีซี 300 ซีซี	เพื่อให้เกิดการแตกตาออก - ตาใบ ลดการหลุดร่วงของดอก และผลอ่อน ช่วยการสร้างเนื้อ ช่วยในการผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของดอก ช่วยในการขยายของใบและผล สารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยในการดูดซึม	
<u>ระยะผลใหญ่</u>	โกรแม็กซ์ 20-20-20 ผสมกับ โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโร-แคล แม็กกำ-ซิงค์ เกรทกรีน พลัส	300 กรัม 300 กรัม 100 กรัม 100 กรัม 50 ซีซี	เพิ่มขนาดของผล ช่วยเพิ่มความหวาน ความแน่นเนื้อ และน้ำหนัก เพิ่มความแน่นเนื้อ ช่วยขยายขนาดของผล สารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยในการดูดซึม	} ฉีดพ่น ทุกๆ 10 วัน

