

## การใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตร หอมแบ่ง, หอมกินใบ

<p>7 วัน หลังดำหอม จนถึงเก็บเกี่ยว</p>	<p>โกรแม็กซ์ 30-10-10 โบโร-แคล เม็กกา-ซิงค์ ท้อป-เอ็น 30-0-0 แม็กนีเซียม เกรทกรีน พลัส</p>	<p>50 กรัม (7 ซ้อนแกง) 5 กรัม ซ้อนตวง) 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 50 ซีซี (2 ฝา ท้อป-เอ็น) 20 กรัม (2 ซ้อนแกง) 5 ซีซี (2 ซ้อนกาแฟ)</p>	<p>เร่งต้น, โบ ขยายราก ทำให้แข็งแรง ยึดต้น, โบ บำรุงต้น, กอ, โบ  เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ</p>	<p>ฉีดพ่น ทุก 7 วัน พ่น 2-3 ครั้ง เมื่อหอมสูงประมาณ 15 ซม. ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยว เพิ่ม ลิควิด ไอออน 3 ซีซี./ น้ำ 20 ลิตร ทำให้หอมตลอดใหญ่และเขียวมากขึ้น</p>
--	--	--	--	--

ปุ๋ยรองพื้น ใช้ 25-7-7 อัตรา 25 กก./ไร่ หลังดำหอมได้ 5-7 วัน (หอมเริ่มแตกยอดแล้ว) ไม่ควรใช้เทอร์โบแม็ก

### หมายเหตุ

เมื่อหอมเป็นโรคหรือช่วงฝนตกชุก ให้หยุดปุ๋ยที่ใส่ให้งาม สูตร 30-10-10 , 15-15-15 ฉีดพ่นโบโร-แคล 2-3 ซ้อนตวง ผสมยาฆ่าเชื้อรา ในฤดูฝน ควรเปลี่ยนปุ๋ยโกรแม็กซ์ 30-10-10 เป็น 15-15-15

