

การใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตรกับหอมแดง (หอมกินหัว)

7 - 20 วัน หลังดำหอม	โกโรแม็กซ์ 20-20-20 โบโร-แคล แม็กกำ-ซิงค์ ทือป-เอ็น 30-0-0 เกรทกรีน พลัส	30-50 กรัม (4 ซ้อนแกง) 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 50 ซีซี (2 ฝา ทือป-เอ็น) 5 ซีซี (2 ซ้อนกาแฟ)	เร่งต้น, โบ ขยายราก ทำให้ใบแข็งแรง ยืดต้น, โบ บำรุงต้น, กอ, โบ เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} อีตพัน ทุก 7 วัน
ปุ๋ยรองพื้น ใช้ 16-20-0 หรือ 12-12-17 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ ผสมเทอร์โบแม็ก 5 กก. หลังดำหอมได้ 5-7 วัน (หอมเริ่มแตกยอดแล้ว)				
20 วัน	โกโรแม็กซ์ 20-20-20 โบโร-แคล แม็กกำ-ซิงค์ เกรทกรีน พลัส	50 กรัม (4 ซ้อนแกง) 10 กรัม (2 ซ้อนตวง) 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 5 ซีซี (2 ซ้อนกาแฟ)	เตรียมต้นก่อนลงหัว ขยายราก ทำต้นให้แข็งแรง ยืดต้น เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} อีตพัน ทุก 7 วัน
ปุ๋ยทางดิน ใช้ 12-12-17 อัตรา 25 กก./ไร่				
28 วัน	โกโรแม็กซ์ 10-52-17 โบโร-แคล โบรท์กิ้น เกรทกรีน พลัส	50 กรัม (4 ซ้อนแกง) 10 กรัม (2 ซ้อนตวง) 5 ซีซี (2 ซ้อนกาแฟ) 5 ซีซี (2 ซ้อนกาแฟ)	หยุดโบ ลงหัว เร่งการลงหัว ทำให้หัวแน่น ช่วยเสริมประสิทธิภาพของโบ เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} อีตพัน ทุก 7 วัน
ปุ๋ยทางดินใส่ 12-12-17 หรือ 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ เมื่อหอมอายุ 35 วัน				
35 วัน	โกโรแม็กซ์ 6-20-30 โบโร-แคล โบรท์กิ้น เกรทกรีน พลัส	50-100 กรัม (4 ซ้อนแกง) 10 กรัม (2 ซ้อนตวง) 5 ซีซี (2 ซ้อนกาแฟ) 5 ซีซี (2 ซ้อนกาแฟ)	เร่งลงหัว, หัวแน่น ช่วยให้หัวแน่น มีน้ำหนัก ทำให้ใบแข็งแรง ไม่มีโรค ช่วยเสริมประสิทธิภาพของโบ เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} อีตพันทุก 7 วัน

