



ช่วงเร่งต้น

การใช้ผลิตภัณฑ์กับถั่วเขียว

<p>โกธรมแม็กซ์ 15-15-15 หรือ 20-20-20 โบโร-แคล โมเด็ม เกรทกรีนหรือเกรทกรีน พลัส</p>	<p>50 กรัม (4 ช้อนแกง) 10 กรัม (2 ช้อนตวง) 5 ซีซี (ครึ่งช้อนโบโร-แคล) 5 ซีซี (ครึ่งช้อนโบโร-แคล)</p>	<p>บำรุงต้น, โบ สร้างควมร็องแรงของราก, โบ ช่วยเร่งยอด, เถา, ช่วยด้วสร้างปมที่ราก เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ</p>	<p>} อัดพ่น 1 ครั้ง ก่อนท่ว่านปุ๋ยทางดิน 3-5 วัน</p>
---	--	--	--

- เกษตรกรอาจไม่มีการใส่ปุ๋ยให้อัดพ่นเมื่อดัวมีอายุ 14 วันหลังออก
- ถ้ามีการใส่ปุ๋ยแนะนำ 16-20-0+0-0-60 อย่างละ 20 กก. ผสมกันต่อ 1 ไร่
- ผสมเทอร์โบแม็ก ต่อปุ๋ยเม็ดทางดินในอัตราส่วนปุ๋ยทางดิน 50 กก. ต่อ เทอร์โบแม็ก 3-5 กก.

<p>ช่วงเร่งดอก</p>	<p>โกธรมแม็กซ์ 10-52-17 โบโร-แคล โมเด็ม หรือแม็กกาซิงค์ เกรทกรีนหรือเกรทกรีน พลัส</p>	<p>50 กรัม (4 ช้อนแกง) 10 กรัม (2 ช้อนตวง) 5 ซีซี (2 ช้อนชา) 5-10 กรัม (1-2 ช้อนตวง) 5 ซีซี (ครึ่งช้อนโบโร-แคล)</p>	<p>บำรุงต้น, โบ สร้างควมร็องแรงของราก, โบ ช่วยเร่งยอด, เถา, ช่วยด้วสร้างปมที่ราก เร่งการแตกยอด, ดอก เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ</p>	<p>} อัดพ่นเมื่อดัวอายุ 30 วัน</p>
<p>ช่วงสะสมน้ำหนัก</p>	<p>โกธรมแม็กซ์ 6-20-30 โบโร-แคล เกรทกรีนหรือเกรทกรีนพลัส</p>	<p>50 กรัม (4 ช้อนแกง) 10 กรัม (2 ช้อนตวง) 5 ซีซี ครึ่งช้อนโบโรแคล</p>	<p>บำรุงต้น, ฝัก ขั้วเหนียว, ฝักแน่น เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ</p>	

ปุ๋ยโกธรมแม็กซ์ ที่ใช้กับถั่วเขียว, ถั่วเหลือง ไม่ควรเกิน 50 กรัม
ถ้าใช้มาก ตัวฝักจะบริหรือแตกออก

