

การใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตรกับทุเรียน

ระยะเร่งการแตกยอดและบำรุงใบ : พันเน้นใบ	โกรแม็กซ์ 20-20-20 โบโร-แคล เกรทกรีน เม็ก้า-ซิงค์	1 กิโลกรัม 100 กรัม (1 ซีด) 30 ซีซี 50 กรัม (1/2 ซีด)	ใ้ใบใหญ่ แตกใบดี สร้างใบให้แข็งแรง ออกรากดี เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยยืดยอดและขยายใบ
ระยะสะสมอาหาร : พันเน้นใบ	ท็อป-เค 0-0-25 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส เทอร์โบไทโอแม็ก	300 ซีซี 50 กรัม (1/2 ซีด) 50 ซีซี 200 ซีซี	ช่วยให้ใบแข็งแรง เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ
ระยะใช้ปล้ำ : พันเน้นใบและดอก	โกรแม็กซ์ 10-52-17 โบโร-แคล เกรทกรีน เม็ก้า-ซิงค์	500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 30 ซีซี 1 ซีด	ช่วยการสะสมอาหาร เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ
ระยะทางแยงใหม่ ถึงผลขนาด 1 กก. : พันเน้นลูก	โกรแม็กซ์ 15-15-15 ท็อป-เอ็น 30-0-0 โบโร-แคล แม็กนีเซียม เกรทกรีน	300-500 กรัม (3-5 ซีด) 300 ซีซี 100 กรัม (1 ซีด) 200 กรัม (2 ซีด) 30 ซีซี	ป้องกันแตกใบอ่อน ดอกหลุดร่วง ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเกสร เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ
ระยะขยายพู : พันเน้นใบและลูก	โกรแม็กซ์ 20-20-20 โบโร-แคล เกรทกรีน เทอร์โบไทโอแม็ก	500-700 กรัม (5-7 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 30 ซีซี 200 ซีซี	บำรุงลูก และช่วยควบคุมใบอ่อน บำรุงลูก เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ
ระยะเต็มร่าง เ่งสี เพิ่มน้ำหนัก และคุมใบอ่อน : พันเน้นใบและลูก	โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโร-แคล เกรทกรีน เทอร์โบไทโอแม็ก	500-1,000 กรัม (5-10 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 30 ซีซี 200 ซีซี	เพิ่มก้านะดันและเ่งให้ผลแก่ เข้าสี รสหวาน เพิ่มน้ำหนัก ป้องกันไล่ซิม เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ลีควิดไอออน 30 ซีซี ใช้ช่วงเริ่มแตกใบอ่อน เพิ่มความเขียวของใบ
เจอร์มิเนท 200 ซีซี ใช้ช่วงเริ่มแตกใบอ่อน ทำให้แตกพร้อมกันมากขึ้น

