

สับปะรด เทคนิคการใช้ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารเสริมและการดูแลรักษา

ระยะเริ่มปลูก ปุ๋ยทางดิน	ซุบหน่อด้วยเจอร์มิเนท 25-7-7 หรือ 21-7-14 หรือ 16-16-16 หรือ 21-0-0 ผสมเทอร์โบแม็ก	100 ซีซี ต่อหน้า 20 ลิตร 5 กก. ต่อปุ๋ย 50 กก.	ซุบแล้วฝังให้แห้งก่อนนำไปปลูก
ปุ๋ยทางใบ	เกรทกรีน โบโร-แคล ปุ๋ยโกรแมกซ์ 15-15-15	150 ซีซี 300 กรัม (3 ซีต) 3-5 กิโลกรัม	ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน
ก่อนทยอยค้ำกิ่ง 14-21 วัน	ปุ๋ยโกรแมกซ์ 10-52-17 หรือท็อป-เค เทอร์โบโพลีเอแม็ก โบโร-แคล เกรทกรีน	3-5 กิโลกรัม 1.5 ลิตร 1 ลิตร 3 ซีต 150 ซีซี	ฉีด 1 ครั้ง
ระยะคอกแดง	เกรทกรีน โบโร-แคล ปุ๋ยโกรแมกซ์ 10-52-17 ท็อป-เอ็น	150 ซีซี 300 กรัม (3 ซีต) 3-5 กิโลกรัม 2.5 ลิตร, 1-2 ลิตร	ฉีด 1 ครั้ง
ระยะหัวเท่ากำปั้น	เกรทกรีน โบโร-แคล ปุ๋ยโกรแมกซ์ 15-15-15 แม็กกำ-ซิงค์	150 ซีซี 300 กรัม (3 ซีต) 3-5 กิโลกรัม 2 ซีต	ฉีด 1 ครั้ง
ระยะก่อนเก็บ 1 เดือน	เกรทกรีน โบโร-แคล ปุ๋ยโกรแมกซ์ 6-20-30	150 ซีซี 300 กรัม (3 ซีต) 3-5 กิโลกรัม	ฉีด 1 ครั้ง

