

การใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตร กับเกษตรกร

| | | | | |
|----------------|--|---|---|--|
| ระยะแตกยอด | เถรเทศ โกธเม็ทซ์ 30-10-10 หรือ 20-20-20 โบโรแคล เม็ทซ์ซิงค์ เม็ทซ์ซี | 30 ซี.ซี. (1 ฝาเถรเทศ) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 50-100 กรัม (1/2-1 ซีด) 200 กรัม (2 ซีด) | เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เร่งการแตกยอด สร้างความแข็งแรงของใบ ช่วยยืดยอดและขยายใบ สร้างความเขียว | ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน |
| ระยะออกดอก | เถรเทศ โกธเม็ทซ์ 10-52-17 โบโรแคล | 30 ซี.ซี. (1 ฝาเถรเทศ) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) | เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ หยุดใบเพื่อสะสมอาหาร ป้องกันผลร่วง/ช่วยผสมเกสร | |
| ระยะขยายขนาดผล | เถรเทศ โกธเม็ทซ์ 15-15-15 หรือ 20-20-20 ทีโอพี-เอ็น โบโรแคล | 30 ซี.ซี. (1 ฝาเถรเทศ) 500-1000 กรัม (5-10 ซีด) 500 ซี.ซี. (1/2 ลิตร) 100 กรัม (1 ซีด) | เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยขยายขนาดผล, บำรุงผล ช่วยเลี้ยงลูกเล็กสร้างเมล็ด เปลือก และขยายลูก ป้องกันผลร่วง | ฉีดกลับช่วงกับ ทีโอพีเอ็น 30-0-0 ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน *ฉีดโบโรทกรีท 30 ซี.ซี./ น้ำ 200 ลิตร เดือนละ 1-2 ครั้งเป็นครั้งคราว ทำให้เลี้ยง ลูกเก่ง แก้ปัญหาต้นโทรม |
| ก่อนเก็บผลผลิต | เถรเทศ โกธเม็ทซ์ 6-20-30 สลับ โกธเม็ทซ์ 15-15-15 หรือ 20-20-20 โบโรแคล | 30 ซี.ซี. (1 ฝาเถรเทศ) 500 กรัม (5 ซีด) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) | เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เพิ่มน้ำหนัก ความแน่นเนื้อ ความหวาน สร้างเนื้อผล เพิ่มน้ำหนัก ความแน่นเนื้อ | ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน |

