

การใช้ผลิตภัณฑ์เกษตร กับ ขนุน

<p>ระยะเก็บผลแล้ว บำรุงใบ</p>	<p>เกอร์ทกรีนพลัส โบโรแคล โกโรแม็กซ์ 30-10-10 แม็กนีเซีย แม็กกำซิงค์</p>	<p>50 ซีซี (2 ฝาเกอร์ทกรีนพลัส) 50-100 กรัม (1/2-1 ชีด) 500 กรัม (5 ชีด) 200 กรัม (2 ชีด) 50-100 กรัม (1/2-1 ชีด)</p>	<p>เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ สร้างความแข็งแรงของใบ ขยายและสร้าง รากใหม่ เพื่อสร้างใบอ่อน ขยายใบอ่อน เพิ่มความเขียว ขยายขนาดใบ</p>	<p>พ่นทุก 10 - 15 วัน ใส่ปุ๋ยคอก ตามขนาดของต้น 10-20 กก./ต้น ปุ๋ยเคมี ใช้สูตร 21-7-14 หรือ 25-7-7 (การใส่ปุ๋ยเม็ดทางดินควรใส่แต่น้อย แต่บ่อยครั้ง โดยใส่ตามขนาดของต้น)</p>
<p>ช่วงทำใบควรให้ขนุนออกใบอ่อนอย่างน้อย 2 ชุด เพื่อสร้างใบใหม่ โดยใบชุดใหม่ จะทำหน้าที่เลี้ยงดอกและผลในรุ่นต่อไป หลังจากแตกใบอ่อน ประมาณ 1 เดือน เปลี่ยนสูตร 30-10-10 เป็น 15-15-15 ตัวอื่นเหมือนเดิม</p>				
<p>ระยะแทงช่อดอก (พ่นเน้นใบและดอก)</p>	<p>เกอร์ทกรีนพลัส โบโรแคล โกโรแม็กซ์ 10-52-17 แม็กกำซิงค์</p>	<p>50 ซีซี (2 ฝาเกอร์ทกรีนพลัส) 50-100 กรัม (1/2-1 ชีด) 500 กรัม (5 ชีด) 50-100 กรัม (1/2-1 ชีด)</p>	<p>เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ ป้องกันผลร่วง เพื่อเปิดตาดอก สร้างผลอ่อน ยึดช่อดอก</p>	<p>พ่นทุก 7 - 10 วัน</p>
<p>ระยะบำรุงผลเล็ก (บำรุงผลและ ใบภายในทรงพุ่ม)</p>	<p>เกอร์ทกรีนพลัส โบโรแคล โกโรแม็กซ์ 15-15-15 ท็อปเอ็น 30-0-0 แม็กนีเซีย</p>	<p>50 ซีซี (2 ฝาเกอร์ทกรีนพลัส) 50-100 กรัม (1/2-1 ชีด) 500 กรัม (5 ชีด) 300 ซีซี 200 กรัม (2 ชีด)</p>	<p>เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ สร้างความแข็งแรง บำรุงผล ขยายผล สร้างเปลือก ขยายผล เพิ่มความเขียว</p>	<p>พ่นทุก 10 วัน ปุ๋ยทางดินใส่ 21-7-14 หรือ 24-9-20 • ฉีดพ่นโบรท์กรีน 30 ซีซี/200ลิตร ฉีดพ่น เดือนละ 1-2 ครั้ง</p>
<p>ระยะบำรุงผลใหญ่ (บำรุงผลและ ใบภายในทรงพุ่ม)</p>	<p>เกอร์ทกรีนพลัส โบโรแคล โกโรแม็กซ์ 20-20-20 เทอโรโบไฮโอแม็กซ์</p>	<p>50 ซีซี (2 ฝาเกอร์ทกรีนพลัส) 50-100 กรัม (1/2-1 ชีด) 500 กรัม (5 ชีด) 200 ซีซี</p>	<p>เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ สร้างความแข็งแรง บำรุงผล ขยายผล สร้างเปลือก เพิ่มความเขียว</p>	<p>พ่นทุก 10 วัน ปุ๋ยทางดินใส่ 21-7-14 หรือ 24-9-20 • ฉีดพ่นโบรท์กรีน 30 ซีซี/200ลิตร ฉีดพ่น เดือนละ 1-2 ครั้ง</p>

