



## บีโกร-แคล

บีโกร-แคล ประกอบด้วย แคลเซียม ในรูปของแคลเซียมคิเลทหรือในรูป ( $\text{CaO}$ ) 9% และไบرون 2% เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ลงมาใช้ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ขยายป้องกันกำจัดแมลง ยาป้องกันกำจัดเชื้อรา เพราะ.....

1. พิชต้องการแคลเซียมทุกระยะการเจริญเติบโต และชาตุแคลเซียม เป็นชาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายในพิช หลังจากเป็นส่วนประกอบของเซลล์แล้ว
2. บีโกร-แคล กระตุ้นการแทรกตาก ทำให้รากถูกเน่าและร้าวจากต้นได้มากขึ้น
3. บีโกร-แคล ทำให้พิชทนแล้ง เมื่อจะจากน้ำมากหอยหอยมาก
4. บีโกร-แคล ทำให้ผ่านเซลล์เมืองความแข็งแรงมากสามารถป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อร้ายได้
5. บีโกร-แคล สามารถป้องกันโรคเชื้อร้ายที่เกิดกับผลผลิตในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว หรือเก็บเกี่ยวไปแล้วจากเชื้อร้ายได้ดี เป็นโรคกันเน่าของมะเขือเทศ พริกหยอด พะยอม โรคราดที่เปลือกของผลไม้ ผลรุกของฟรั่ง
6. บีโกร-แคล เสริมสร้างความแข็งแรงของเกรดรั้วผู้ดูแลและเกรดรั้วเมีย ความแข็งแรงของรังไข่ แก้ปัญหาการหลุดร่วง
7. บีโกร-แคล เพิ่มอัตราการเคลื่อนย้ายอาหารจากใบมาที่ผลหรือหัวหรือส่วนผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ทำให้มีผลผลิตมีน้ำหนักดี ลดขนาดต้นท่านที่ออกขนส่ง และมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวนาน
8. บีโกร-แคล ช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อย เช่นจากขาดโนรอนในหัวไชเท้าหรือการห่อหัวไม่แน่นของกะหล่ำปลี แก้ปัญหาคอกเป็นจุดคำของกะหล่ำปลี

**\*\* ใช้บีโกร-แคลทุกครั้งป้องกันเชื้อร้าย\*\***

**\*\*บีโกร-แคลใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปีนใจเกษตรกรได้ดี\*\***

อัตราการใช้ บีโกร-แคลแนะนำการใช้หยอดอัตราขึ้นอยู่กับสภาพของพิช ดังนี้

- **สภาพปกติ** ใช้บีโกร-แคล 1 ข้อนหง (5 กรัม) ต่อน้ำ 20 ลิตร อีกพ่นทุก 7-10 วัน พร้อมปุ๋ยทางใบหรือพร้อมยาป้องกันกำจัดศัตรูพิช ยกเว้นยาฆ่าหญ้า เพื่อล่วงเครื่องให้พิชแข็งแรงเติบโตดี มีระบบราชตี ข้าวตอก-ผล เห็นยาผลผลิตมีน้ำหนักดี
- **สภาพผิดปกติ** เมื่อพิชเป็นโรคหรือเมื่อต้องการให้พิชต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อร้าย ใช้ 2 ข้อนหง (10 กรัม) ต่อน้ำ 20 ลิตร ถ้าเป็นมากๆ อาจเพิ่มให้ถึง 3-4 ข้อนหง ต่อน้ำ 20 ลิตร อีกพร้อมยาป้องกันกำจัดเชื้อร้าย แต่กรีดในอัตราสูง 3-4 ข้อนหง ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำให้ฉีดในช่วงระยะเวลา 2-3 ครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นต้องกลับมาฉีดในอัตราปกติ (ไม่เกิน 1-2 ข้อนหง ต่อน้ำ 20 ลิตร)

เมื่อต้องการให้พิชทนแล้ง อีกพ่นบีโกร-แคลอัตรา 2 ข้อนหง (10 กรัม) ต่อน้ำ 20 ลิตร พร้อมๆ กับท็อป-เอ็น (30-0-0) อัตรา 100 ซีซี 2-3 ครั้งทุก 10 วัน

- พิชผัดกินใบ ระยะต้นเล็กมาก มี 2-3 ใบจริง ห้ามใช้บีโกร-แคล 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร จะทำให้ผัดขึ้นใบ หันไม่ค่อยอิ่มขยาย ให้ใช้เพียง 2-5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร