

การใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับเงาะ:

ระยะเวลาใบ (ทำใบ 2-3 ชุด)	ระยะเวลาใบอ่อน	เกษตรกรีนพลัส โกโรแม็กซ์ 30 -10 -10 โบโรแคล แม็กกำซิงค์ แม็กบีเซีย	50 ซี.ซี. (2 ฝาเกษตรกรีน) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 50-100 กรัม (1/2-1ซีด) 200 กรัม (2 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เร่งการแตกยอด สร้างความแข็งแรงของใบ ช่วยยึดยอดและขยายใบ สร้างความเขียว เพิ่มแม็กบีเซีย	ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน
	ระยะเวลาใบผลิลาต หรือหลังจากใบขยาย ขนาดเต็มที่	เกษตรกรีนพลัส โกโรแม็กซ์ 15- 15- 15 โบโรแคล แม็กกำซิงค์	50 ซี.ซี. (2 ฝาเกษตรกรีน) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 50-100 กรัม (1/2-1ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยให้ใบแก่สะสมอาหาร สร้างความแข็งแรงของใบ ช่วยเพิ่มความหนาของใบ	
ก่อนแตกใบชุดใหม่ ควร ฉีดพ่น โกโรแม็กซ์ 10-52-17 หรือ 6-20-30 อัตรา 800-1000 กรัม เพื่อให้ใบแก่มีความสมบูรณ์ และควรผสมเกษตรกรีนพลัส อัตรา 50 ซีซีและโบโรแคล 100 กรัม ฉีดพ่น 1 ครั้ง					
ระยะเวลาสะสมอาหารเพื่อการออกดอก	เกษตรกรีนพลัส ท็อบเค 0-0-25 เทอร์โบไทโอแมก โบโรแคล	50 ซี.ซี. (2 ฝาเกษตรกรีน) 300 ซีซี 200 ซีซี 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ หยุดใบเพื่อสะสมอาหาร -เร่งการออกดอก เพิ่มความเขียวใบ ช่วยสะสมอาหาร/ช่วยผสมเกสร	ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน เมื่อใบชุดสุดท้ายผลิลาต ฉีดพ่น 3-4 ครั้ง	
ระยะเวลาช่วงดอก	เกษตรกรีนพลัส โกโรแม็กซ์ 10-52-17 โบโรแคล แม็กกำซิงค์	50 ซี.ซี. (2 ฝาเกษตรกรีน) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 50-100 กรัม	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เร่งการออกดอก ป้องกันผลร่วง/ช่วยผสมเกสร ช่วยยึดขยายช่อดอก	ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน	
ระยะติดผลเล็ก	เกษตรกรีนพลัส โกโรแม็กซ์ 15-15-15 ท็อบเอ็น 30-0-0 แม็กกำซิงค์ โบโรแคล	50 ซี.ซี. (2 ฝาเกษตรกรีน) 500 กรัม (5 ซีด) 500 ซี.ซี (1/2 ลิตร) 50-100 กรัม (1/2-1ซีด) 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยขยายขนาดผล,บำรุงผล บำรุงผล,สร้างเนื้อ ช่วยขยายขนาดของผล ป้องกันผลร่วง	ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน/ครั้ง *ฉีดโบรท์กรีน 30 ซี.ซี/น้ำ 200 ลิตร เดือนละ 1-2 ครั้ง	
ก่อนการเก็บเกี่ยว	เกษตรกรีนพลัส โกโรแม็กซ์ 6-20-30 โบโรแคล	50 ซี.ซี. (2 ฝาเกษตรกรีน) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เนื้อแน่น, เพิ่มน้ำหนักความหวาน เพิ่มน้ำหนัก ,เนื้อแน่น	ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน	

