

การใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับชมพู

ระยะสะสมอาหาร	เทอร์โบโทโอแม็กซ์ โกรแม็กซ์ 10-52-17 โบโรแคล เกรทกรีนพลัส	200 ซีซี 800 กรัม (8 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 50 ซี.ซี (2 ฟาเกรทกรีนพลัส)	เพื่อสะสมอาหาร และหยุดการแตกใบอ่อน เพื่อสะสมอาหาร และหยุดการแตกใบอ่อน ช่วยในการสะสมอาหาร สารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยในการดูดซึม	ฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน
ระยะแทงช่อดอก	โกรแม็กซ์ 10-52-17 แม็กกาซิงค์ โบโรแคล เกรทกรีนพลัส	800 กรัม (8 ซีด) 50 กรัม (1/2 ซีด) 50 กรัม (1/2 ซีด) 50 ซี.ซี (2 ฟาเกรทกรีนพลัส)	บำรุงช่อดอกและสะสมอาหาร ช่วยยืดขยายช่อดอกและดอก ป้องกันดอกและผลร่วง สารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยในการดูดซึม	ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน
ระยะผลเล็ก	โกรแม็กซ์ 15-15-15 ทีโอปเอ็น 30-0-0 โบโรแคล แม็กกาซิงค์ แม็กนีเซียม เกรทกรีนพลัส	300 กรัม (3 ซีด) 300 ซีซี 100 กรัม (1 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 200 กรัม (2 ซีด) 50 ซี.ซี (2 ฟาเกรทกรีนพลัส)	ช่วยในการสร้างเนื้อ ช่วยสร้างเปลือกขยายลูก เพิ่มความแน่นเนื้อ ช่วยในการยืดขยายผล เพิ่มความเขียวของใบ และผล สารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยในการดูดซึม	ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน * ช่วงนี้ เพิ่มโบรทกรีน อัตรา 30 ซีซี / 200ลิตร เป็นครั้งคราว ทำให้เลี้ยงลูกแก่ แก้ปัญหาต้นไหม
ระยะผลใหญ่	โกรแม็กซ์ 20-20-20 ผสมกับ โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโรแคล แม็กกาซิงค์ แม็กนีเซียม เกรทกรีนพลัส	300 กรัม (3 ซีด) 300 กรัม (3 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 200 กรัม (2 ซีด) 50 ซี.ซี (2 ฟาเกรทกรีนพลัส)	เพิ่มขนาดของผล ช่วยเพิ่มความหวาน ความแน่นเนื้อ และน้ำหนัก เพิ่มความแน่นเนื้อ ช่วยขยายขนาดของผล เพิ่มความเขียวของใบ และผล สารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยในการดูดซึม	ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน

