

การใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับพุทรา

ระยะแตกยอด	เกษตรกร โกโรแม็กซ์ 30 -10 -10 หรือ 20-20-20 โบโรแคล แม็กกำซิงค์ แม็กนิเซียม	30 ซี.ซี. (1 ฝาเกษตรกร) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 50-100 กรัม (1/2-1 ซีด) 200 กรัม (2 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เร่งการแตกยอด สร้างความแข็งแรงของใบ ช่วยยืดยอดและขยายใบ สร้างความเขียว	ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน
ระยะออกดอก	เกษตรกร โกโรแม็กซ์ 10-52-17 โบโรแคล	30 ซี.ซี. (1 ฝาเกษตรกร) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ หยุดใบเพื่อสะสมอาหาร ป้องกันผลร่วง/ช่วยผสมเกสร	ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน
ระยะขยายขนาดผล	เกษตรกร โกโรแม็กซ์ 15-15-15 หรือ 20-20-20 ทีโอป-เอ็น โบโรแคล	30 ซี.ซี. (1 ฝาเกษตรกร) 500-1000 กรัม (5-10 ซีด) 500 ซี.ซี. (1/2 ลิตร) 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยขยายขนาดผล, บำรุงผล ช่วยเลี้ยงลูกเล็กสร้างเมล็ด เปลือก และขยายลูก ป้องกันผลร่วง	ฉีดสลับช่วงกับ ทีโอป-เอ็น 30-0-0 ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน *ฉีดใบสัปดาห์ 30 ซี.ซี./ น้ำ 200 ลิตร เดือนละ 1-2 ครั้ง เป็นครั้งคราว ทำให้เลี้ยงลูกเก่ง แก้ปัญหาต้นไหม
ช่วงบำรุงผล ฉีดพ่นเจอร์มิเนท 200 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเป็นครั้งคราว และควรลดปุ๋ยโกโรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 หรือ 20-20-20 ลงครึ่งหนึ่ง (3ซีดี /น้ำ 200 ลิตร)				
ก่อนเก็บผลผลิต	เกษตรกร โกโรแม็กซ์ 6-20-30 สลับ โกโรแม็กซ์ 15-15-15 หรือ 20-20-20 โบโรแคล	30 ซี.ซี. (1 ฝาเกษตรกร) 500 กรัม (5 ซีด) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เพิ่มน้ำหนัก ความแน่นเนื้อ ความหวาน สร้างเนื้อผล เพิ่มน้ำหนัก ความแน่นเนื้อ	ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน
ปุ๋ยทางดิน หลังตัดแต่งกิ่งใช้สูตร 16-16-16 อัตรา 500 กรัม (5 ซีด) /ต้น ระยะแตกใบอ่อนใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 500 กรัม (5 ซีด) /ต้น				

ปัญหาเรื่องโรค - แมลง

*โรคราแป้ง, ราสนิท ราคา ใช้คาร์เบนดาซิม อัตรา 200 กรัม (2 ซีด) ต่อน้ำ 200 ลิตร ทุก 7-10 วัน

*เพลี้ย, หนอน, ไชเบอร์เนทรีน, ฟิโปรนิล, อิมิดาตลอปรีด, อะบาเม็กติน,

*โรตต่าง โพรพาโกต์, อามมีทราซ (การใช้ยาฆ่าแมลงไม่ควรใช้ชนิดเดียวกัน เพราะจะทำให้แมลงดื้อยา)

