

การใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับมังคุด

ระยะทำใบ (ทำใบ 2-3 ชุด)	ระยะแตกใบอ่อน	เกรทกรีนพัลลัส โกรแม็กซ์ 30 - 10 - 10 โบโรแคล แม็กกำซิงค์ แม็กนิเซียม	50 ซี.ซี. (1 ฝาเกรทกรีนพัลลัส) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด) 50-100 กรัม (1/2-1 ซีด) 200 กรัม (2 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เร่งการแตกยอด สร้างความแข็งแรงของใบ ช่วยยืดยอดและขยายใบ สร้างความเขียว	ฉีดพ่น ทุก ๆ 7-10 วัน
	ระยะใบเฟสลาด หรือหลังจากใบขยาย ขนาดเต็มที่	เกรทกรีนพัลลัส โกรแม็กซ์ 0-20-30 โบโรแคล	50 ซี.ซี. (1 ฝาเกรทกรีนพัลลัส) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยให้ใบแก่สะสมอาหาร สร้างความแข็งแรงของใบ	
ระยะสะสมอาหาร	เกรทกรีนพัลลัส ท็อบเค 0-0-25 เทอร์โบไทโอแมกซ์ โบโรแคล	50 ซี.ซี. (1 ฝาเกรทกรีนพัลลัส) 300 ซี.ซี. 200 ซี.ซี. 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ หยุดใบเพื่อสะสมอาหาร -เร่งการออกดอก เพิ่มความเขียวใบ ป้องกันผลร่วง/ช่วยผสมเกสร	ฉีดพ่น ทุก ๆ 7-10 วัน เมื่อใบชูดสุดท้ายเฟสลาด ฉีดพ่นไม่เกิน 2 ครั้ง	
ระยะเริ่มออกดอกปากนกแก้ว	เกรทกรีนพัลลัส โกรแม็กซ์ 10-52-17 แม็กกำซิงค์ โบโรแคล	50 ซี.ซี. (1 ฝาเกรทกรีนพัลลัส) 500 กรัม (5 ซีด) 50-100 กรัม (1/2-1 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ หยุดใบเพื่อสะสมอาหาร -เร่งการออกดอก เพิ่มความเขียวใบ ป้องกันผลร่วง/ช่วยผสมเกสร	ฉีดพ่น ทุก ๆ 7-10 วัน เมื่อใบชูดสุดท้ายเฟสลาด ฉีดพ่นไม่เกิน 2 ครั้ง	
ระยะติดผลเล็ก	เกรทกรีนพัลลัส โกรแม็กซ์ 15-15-15 ท็อบเอ็น 30-0-0 โบโรแคล แม็กนิเซียม	50 ซี.ซี. (1 ฝาเกรทกรีนพัลลัส) 500 กรัม (5 ซีด) 300 ซี.ซี. 100 กรัม (1 ซีด) 200 กรัม (2 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยขยายขนาดผล, บำรุงผล บำรุงผล, สร้างเนื้อ ป้องกันเนื้อแก้ว, ผลร่วง ช่วยขยายขนาดของผล	ฉีดพ่น ทุก ๆ 10-15 วัน ฉีดใบรทุกวัน 30 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร เดือนละ 1-2 ครั้ง	
ระยะผลเท่ามะนาวถึงเข้าสี	เกรทกรีนพัลลัส โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโรแคล	50 ซี.ซี. (1 ฝาเกรทกรีนพัลลัส) 500 กรัม (5 ซีด) 100 กรัม (1 ซีด)	เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เนื้อแน่น เพิ่มน้ำหนักความหวาน เพิ่มน้ำหนัก เนื้อแน่น	ฉีดพ่น ทุก ๆ 7-10 วัน	

