

## การใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกับยาสูบ

7-21 วัน หลังย้ายกล้า	โกรแม็กซ์ 30-10-10 โบโรนคล โมเนียม แมกนีเซียม เกรทกรีนพลัส	50-70 กรัม 5 กรัม 3 ซี.ซี. 5 กรัม 5 ซี.ซี.	เร่งต้น , โบ สร้างความแข็งแรงของราก, โบ ส่งเสริมการใช้ไนโตรเจน ช่วยยืดยอด, ต้น เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	ฉีดทุก 7 วัน สามารถใช้ สามารถใช้ ท็อปอิน 30-0-0 ทดแทน 30-10-10 ได้ 1 ครั้ง
21-50 วัน หลังย้ายกล้า	โกรแม็กซ์ 20-20-20 โบโรนคล  แมกนีเซียม แมกนีเซียม เกรทกรีนพลัส	70 กรัม 5 กรัม  20 กรัม 5 กรัม 5 ซี.ซี.	สร้างคุณภาพของใบ, ขยายใบ ส่งเสริมความแข็งแรงทางราก สร้างคุณภาพเนื้อใบ สร้างสีเขียว เพิ่มแมกนีเซียม เพิ่มธาตุสังกะสี เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	ฉีดพ่นทุก 7 วัน
50 วัน เก็บใบยา	โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโรนคล เกรทกรีน	70 กรัม 5 กรัม 3 ซี.ซี.	สร้างเนื้อ, เข้าสี สร้างเนื้อ, เข้าสี เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	ฉีดพ่น 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อยาสูบอายุ 50 วัน ครั้งที่ 2 เมื่อยาสูบอายุ 57 วัน ครั้งที่ 3 เมื่อยาสูบอายุ 75 วัน ครั้งที่ 4 เมื่อยาสูบอายุ 85 วัน ** (กรณีเริ่มเก็บใบยาเมื่ออายุ 60-65 วัน ถ้าเก็บเลื่อนจากนี้ ต้องปรับใช้โดย มีหลักว่าควรฉีดก่อนเก็บใบยา 1 อาทิตย์)

หมายเหตุ : ฉีดแฉก หมายถึงตัดกรรมคา ห้ามตัดพูน

